

GAVIAL 375 SC

FUNGICIDAS

Veiklioji medžiaga: protiokonazolas 175 g/l (15,61 %)
azoksistrobinas 200 g/l (17,83%)

Produkto forma: koncentruota suspensija (SC)

GAVIAL 375 SC – sisteminio poveikio fungicidas skirtas žieminių kviečių, žieminių kvietrugių, vasarinių miežių, vasarinių rugių, žieminių ir vasarinių rapsų, saulėgrąžų, baltųjų garstyčių, sojų ir daržinių aguonų apsaugai nuo grybinių ligų.

Skirtas profesionaliajam naudojimui.



ATSARGIAI

Sukelia smarkų akių dirginimą.

Kenksminga įkvėpus.

Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ono. Gali sukelti alerginę reakciją.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

18,4 procentų mišinio sudaro sudedamosios dalys, kurių ūmus toksiškumas įkvėpus ir susilietus su oda nežinomas.

Stengtis neįkvėpti / rūko / garų / aerozolio.

Mūvėti apsaugines pirštines ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.

Pasijutus blogai, skambinti į Apsinuodijimų informacijos biurą / kreiptis į gydytoją.

Surinkti ištekęsias medžiagas.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti pašalinius asmenis ir gyventojus, operatoriai privalo naudoti ne mažiau kaip 50 proc. dulksną mažinančius purkštukus arba laikytis ne mažesnės kaip 5 metrų apsaugos zonos iki kelių kelkraščių ribos, gyvenamųjų, visuomeninės paskirties, rekreacinių ir bendro naudojimo teritorijų ribos.

Informacija apsinuodijimo atveju +370 52 362 052.

Pakuotės: 0,15 l, 0,25 l, 0,5 l, 1 l, 2 l, 3 l, 4 l, 5 l, 10 l, 20 l, 124 l, 220 l, 222 l.

Registracijos Nr.: AS2-6F(2025)

Siuntos Nr.: žiūrėti ant pakuotės

Pagaminimo data: žiūrėti ant pakuotės
Galiojimo laikas: 2 metai nuo pagaminimo datos

Registracijos savininkas:

„INNVIGO Sp. z o.o.“
Aleje Jerozolimskie 178
02-486 Varšuva
Lenkija
Tel.: +48 22 468 26 70
el. paštas: biuro@innvigo.com

Atstovas Lietuvoje / platintojas:

UAB BALTIC AGRO
Ukmergės g. 322,
LT-12106 Vilnius, Lietuva
Tel.: +370 5 270 1187
Faks.: +370 5 270 1711
www.balticagro.lt

UAB ŽVALGUVA

Metalistų g. 6,
LT-78107 Šiauliai, Lietuva
Tel.: +370 41 54 0219
Faks.: +370 41 54 0616
www.zvalguva.lt

UAB SCANDAGRA

Biochemikų g. 6,
LT-57234, Kėdainiai, Lietuva
Tel.: +370 347 41 551
Faks.: +370 347 41 552
www.scandagra.lt

UAB Agrokoncernas

Vėrupės g. 1, Babtų kaimas,
LT-54328 Kauno rajonas
Tel. +370 37 490490
el. paštas: info@agrokoncernas.lt

**PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ ATIDŽIAI
PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ!**

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Naudojant ir saugant augalų apsaugos produktą laikytis Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklių.

VEIKIMO BŪDAS

GAVIAL 375 SC – sisteminio poveikio fungicidas skirtas žieminių kviečių, žieminių kvietrugių, vasarinių miežių, vasarinių rugių, žieminių ir vasarinių rapsų, saulėgrąžų, baltųjų garstyčių, sojų ir daržinių aguonų apsaugai nuo grybinių ligų.

Produkto sudėtyje yra dvi skirtingo veikimo mechanizmo veikliosios medžiagos.

Protiokonazolas iš triazolų grupės (SBI- DMI, 3 grupė pagal FRAC). Ši medžiaga veikia kaip sterolių biosintezės inhibitorius (demetiliacijos inhibitoriai) – stabdo ergosterolio, pagrindinio

ląstelių membranų struktūrinio elemento, susidarymą. Ši medžiaga yra labai veiksminga nuo daugelio grybinių patogenų ir ilgai veikia.

Azoksistrobinas (ląstelių kvėpavimo inhibitorius – bc1 citochromo inhibitorius – Qol fungicidai, 11 grupė pagal FRAC) - strobilurinių grupės, sisteminio ir translaminarinio veikimo. Jis slopina grybo sporų dygimą, grybienos augimą ir sporų susidarymą. Azoksistrobinas pasižymi kaip apsauginiu taip ir gydomuoju poveikiu prieš daugelį augalų patogeninių grybų.

NAUDOJIMAS

Žieminiai rapsai

Norma: 1,0 l/ha

Purškimų skaičius: 1 kartas per sezoną, pavasarį

Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo: 56 dienos.

Rekomenduojamas vandens kiekis: 200–300 l/ha

Nuo (baltojo) sklerotinio puvinio (*Sclerotinia sclerotiorum*), **verticiliozės** (*Verticillium longisporum*), nuo verticiliozės produktas apsaugo dalinai.

Purškimo laikas: produktą naudoti profilaktiškai arba nedelsiant pastebėjus pirmuosius ligų simptomus, nuo matomų pirmųjų žiedlapių tarpsnio, kai žiedų pumpurai vis dar susiskleidę (geltonas pumpuras) iki visiško žydėjimo tarpsnio: 50 proc. pagrindinio žiedyno žiedų išsiskleidę, senesni žiedlapiai krinta (BBCH 59–65).

Nuo juodosios dėmėtligės (alternariozės) (*Alternaria brassicae*)

Purškimo laikas: produktą naudoti profilaktiškai arba nedelsiant pastebėjus pirmuosius ligos simptomus, nuo visiško žydėjimo tarpsnio: 50 proc. pagrindinio žiedyno žiedų išsiskleidę, senesni žiedlapiai krinta iki žydėjimo tarpsnio pabaigos (BBCH 65–69).

Vasariniai rapsai

Norma: 1,0 l/ha

Purškimų skaičius: 1 kartas per sezoną

Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo: 56 dienos.

Rekomenduojamas vandens kiekis: 200–300 l/ha

Nuo juodosios dėmėtligės (alternariozės) (*Alternaria brassicae*), **fomozės** (*Leptosphaeria maculans*), **Nuo (baltojo) sklerotinio puvinio** (*Sclerotinia sclerotiorum*)

Purškimo laikas: produktą naudoti profilaktiškai arba nedelsiant pastebėjus pirmuosius ligų simptomus, nuo matomų pirmųjų žiedlapių tarpsnio, kai žiedų pumpurai vis dar susiskleidę (geltonas pumpuras) iki žydėjimo tarpsnio pabaigos (BBCH 59–69).

Žieminiai kviečiai

Norma: 1,0 l/ha

Purškimų skaičius: 1 kartas per sezoną, pavasarį

Nuo stiebalūžės*** (*Oculimacula yallundae*), **javų rizoktoniozės***** (*Rhizoctonia cerealis*) ir **fuzariozės **** (**pašaknio ir šaknų puviniai**) (*Fusarium spp.*)

Purškimo laikas: produktą naudoti profilaktiškai arba pastebėjus pirmuosius ligų simptomus, pavasarį, nuo tarpsnio, kai matomi penki ūgliai, iki bamblio 2 tarpsnio (BBCH 25–32). Nuo stiebalūžės rekomenduojama purkšti nuo stiebo augimo tarpsnio pradžios (BBCH 30).

Nuo **geltonųjų rūdžių** ** (*Puccinia striiformis*) ir **lapų septoriozės**** (*Zymoseptoria tritici*).

Purškimo laikas: produktą naudoti profilaktiškai arba nedelsiant pastebėjus pirmuosius ligų simptomus, pavasarį, nuo vėliavinio lapo tarpsnio pradžios iki, kai matomi pirmieji akuotai (BBCH 39–49).

Nuo **miltligės**** (*Blumeria graminis*).

Purškimo laikas: produktą naudoti profilaktiškai arba pastebėjus pirmuosius ligos simptomus, pavasari, nuo tarpsnio, kai matomi penki ūgliai iki žydėjimo pradžios (BBCH 30-59).

Nuo **kviečių dryžligės***** (*Pyrenophora tritici repentis*) ir **rudųjų rūdžių***** (*Puccinia recondita*).

Purškimo laikas: produktą naudoti profilaktiškai arba nedelsiant pastebėjus pirmuosius ligų simptomus, pavasarį, nuo vėliavinio lapo tarpsnio pradžios iki, kai matomi pirmieji akuotai (BBCH 39–49).

Nuo **varpų septoriozės***** (*Septoria nodorum/Phaeosphaeria nodorum*).

Purškimo laikas: produktą naudoti profilaktiškai arba pastebėjus pirmuosius ligų simptomus, nuo žydėjimo tarpsnio pradžios iki pabaigos (BBCH 61–69).

Nuo **varpų fuzariozės**** (*Fusarium culmorum*).

Purškimo laikas: produktą naudoti profilaktiškai arba pastebėjus pirmuosius ligų simptomus, nuo žydėjimo tarpsnio pradžios iki pabaigos (BBCH 61–69).

Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo: 35 dienos.

Rekomenduojamas vandens kiekis: 200–300 l/ha

Žieminiai kvietrugiai

Norma: 1,0 l/ha

Purškimų skaičius: 1 kartas per sezoną, pavasarį

Nuo **miltligės***** (*Blumeria graminis*).

Purškimo laikas: produktą naudoti profilaktiškai arba pastebėjus pirmuosius ligos simptomus, pavasari, nuo tarpsnio, kai matomi penki ūgliai iki žydėjimo pradžios (BBCH 30-59).

Nuo **fuzariozės**** (**pašaknio ir šaknų puviniai**) (*Fusarium spp*) ir **javų rizoktoniozės*** (*Rhizoctonia cerealis*).

Purškimo laikas: produktą naudoti profilaktiškai arba nedelsiant pastebėjus pirmuosius ligų simptomus, pavasarį, nuo tarpsnio, kai matomi penki ūgliai, iki bamblio 2 tarpsnio (BBCH 25–32).

Nuo **lapų septoriozės***** (*Zymoseptoria tritici*).

Purškimo laikas: produktą naudoti profilaktiškai arba nedelsiant pastebėjus pirmuosius ligų simptomus, pavasarį, nuo vėliavinio lapo tarpsnio pradžios iki, kai matomi pirmieji akuotai (BBCH 39–49).

Nuo **kviečių dryžligės***** (*Pyrenophora tritici repentis*), **geltonųjų rūdžių***** (*Puccinia striiformis*) ir **rudųjų rūdžių***** (*Puccinia recondita*).

Purškimo laikas: produktą naudoti profilaktiškai arba nedelsiant pastebėjus pirmuosius ligų simptomus, pavasarį, nuo vėliavinio lapo tarpsnio pradžios iki, kai matomi pirmieji akuotai (BBCH 39–49).

Nuo **varpų septoriozės***** (*Septoria nodorum/Phaeosphaeria nodorum*) ir **varpų fuzariozės**** (*Fusarium culmorum*).

Purškimo laikas: produktą naudoti profilaktiškai arba pastebėjus pirmuosius ligų simptomus, nuo žydėjimo tarpsnio pradžios iki pabaigos (BBCH 61–69).

Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo: 35 dienos.

Rekomenduojamas vandens kiekis: 200–300 l/ha

Vasariniai miežiai

Norma: 1,0 l/ha

Purškimų skaičius: 1 kartas per sezoną

Nuo **varpų fuzariozės***** (*Fusarium culmorum*), **miltligės** (*Blumeria graminis*), **tinkliškoji dryžligė** (*Drechslera teres*), **javų rinchosporiozės** (*Rhynchosporium secalis*), **smulkiosios rūdys** (*Puccinia hordei*).

Purškimo laikas: produktą naudoti profilaktiškai arba nedelsiant pastebėjus pirmuosius ligos simptomus, nuo matomų pirmųjų akuotų tarpsnio iki plaukėjimo tarpsnio pradžios – žiedyno viršūnės išnyra iš makšties, matoma pirmoji varputė (BBCH 49–51).

Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo: 35 dienos.

Rekomenduojamas vandens kiekis: 200–300 l/ha.

Fungicido veiksmingumas: ***- veiksmingas (>80%), **- vidutiniškai veiksmingas (60-80%), *- mažina (40-59,9%).

MAŽOS APIMTIES NAUDOJIMAS

Naudojimas vasarinių rugių, saulėgrąžų, baltųjų garstyčių, sojų ir daržinių aguonų pasėliuose įregistruotas vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsniu.

ATSAKOMYBĖ. Gamintojas neatsako už produkto veiksmingumą, galimą fitotoksiškumą augalams ir derliaus nuostolius. Atsakomybę už galimą neigiamą poveikį prisiima produkto naudotojas.

Vasariniai rugiai

Norma: 1,0 l/ha

Purškimų skaičius: 1 kartas per sezoną

Nuo **fuzariozės** (*Pašaknio ir šaknų puviniai*), **stiebalūžės** (*Oculimacula yallundae*), **miltligės** (*Blumeria graminis*), **rugių rudųjų rūdžių** (*Puccinia recondita*), **javų rinchosporiozės** (*Rhynchosporium secalis*), **varpų fuzariozės** (*Fusarium culmorum*), **rugių dryžligės** (*Pyrenophora tritici repentis*).

Purškimo laikas: produktą naudoti profilaktiškai arba nedelsiant pastebėjus pirmuosius ligų simptomus, nuo matomų penkių ūglių tarpsnio iki žydėjimo tarpsnio pabaigos (BBCH 25–69).

Naikinant fuzariozę (*Pašaknio ir šaknų puviniai*), purkšti iki 2 bamblio tarpsnio (BBCH 32).

Naikinant varpų fuzariozę ir akuotų septoriozę, produktą naudoti nuo plaukėjimo pradžios, kai varpos viršūnėlė išlenda iš lapamkaštės ir vos matomos pirmosios varputės (BBCH 51).

Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo: 35 dienos.

Rekomenduojamas vandens kiekis: 200–300 l/ha

Saulėgrąžos

Norma: 1,0 l/ha

Purškimų skaičius: 1 kartas per sezoną

Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo: 56 dienos.

Rekomenduojamas vandens kiekis: 200–300 l/ha

Nuo *saulėgrąžų alternariozės* (*Alternaria helianthin*), *saulėgrąžų stiebų juodosios dėmėtligės* (*Leptosphaeria lindquistii*), *saulėgrąžų tikrosios miltligės* (*Erysiphe cichoracearum*), *pilkojo kekerinio puvinio* (*Botrytis cinerea*), *baltojo puvinio* (*Sclerotinia sclerotiorum*).

Purškimo laikas: produktą naudoti profilaktiškai arba nedelsiant pastebėjus pirmuosius ligų simptomus, nuo aštuntojo lapo tarpsnio iki žydėjimo tarpsnio pabaigos (BBCH 18–69).

Sojos

Norma: 1,0 l/ha

Purškimų skaičius: 1 kartas per sezoną

Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo: 56 dienos.

Rekomenduojamas vandens kiekis: 200–300 l/ha

Nuo *fuzariozės* (*Fusarium spp.*), *šaknų puvinio* (*Fusarium oxysporum*), *sojų lapų rudosios dėmėtligės* (*Septoria glycines*), *baltojo puvinio* (*Sclerotinia sclerotiorum*)

Purškimo laikas: produktą naudoti profilaktiškai arba nedelsiant pastebėjus pirmuosius ligų simptomus, nuo tarpsnio, kai yra matomi išsiskleidę lapai ant antro bambio iki matomas pirmasis šoninis ūglis (BBCH 12 – 40) ir nuo derliaus nuėmimui skirtų vegetatyvinių dalių vystymosi tarpsnio pabaigos iki žydėjimo pabaigos (BBCH 49 – 69).

Baltosios garstyčios

Norma: 1,0 l/ha

Purškimų skaičius: 1 kartas per sezoną

Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo: 56 dienos.

Rekomenduojamas vandens kiekis: 200–300 l/ha

Nuo *juodosios dėmėtligės* (*Alternaria brassicicola*), *fomozės* (*Leptosphaeria maculans*), *baltojo puvinio* (*Sclerotinia sclerotiorum*).

Purškimo laikas: produktą naudoti profilaktiškai arba nedelsiant pastebėjus pirmuosius ligų simptomus, nuo geltonojo pumpuro tarpsnio iki žydėjimo tarpsnio pabaigos (BBCH 59–69).

Daržinės aguonos

Norma: 1,0 l/ha

Purškimų skaičius: 1 kartas per sezoną

Nuo **pilkojo puvinio** (*Botrytis cinerea*),
baltojo puvinio (*Sclerotinia sclerotiorum*)

Purškimo laikas: produktą naudoti profilaktiškai arba nedelsiant pastebėjus pirmuosius ligų simptomus, nuo žydėjimo tarpsnio pradžios iki žydėjimo tarpsnio pabaigos (BBCH 59–69).

Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo: 56 dienos.

Rekomenduojamas vandens kiekis: 200–300 l/ha

PASTABOS

Produktą purkšti, kai oro temperatūra aukštesnė kaip 12 °C.

Vengti produkto patekimo į aplinką ne pagal paskirtį.

SĖJOMAINA

Kitais metais galima auginti visus augalus be apribojimų. Jei dėl kokių nors priežasčių pasėliai purkšti GAVIAL 375 SC žuvo, prieš sėjant bet kokius kitus augalus, dirvą reikia suarti 25 cm gyliu.

MAIŠYMAS

Dėl maišymo su kitais augalų apsaugos produktais kreipkitės į registracijos savininko atstovus Lietuvoje.

Gavial 375 SC mišinių su kitais augalų apsaugos produktais poveikis žmonių sveikatai, aplinkai ir veiksmingumas nevertintas.

ATSPARUMO IŠSIVYSTYMO RIZIKOS MAŽINIMO PRIEMONĖS

Produkto sudėtyje yra dvi skirtingo veikimo mechanizmo veikliosios medžiagos: protiokonazolas iš triazolų grupės (sterolių biosintezės fungicidai inhibitoriai – demetiliacijos inhibitoriai, SBI-DMI, 3 grupė pagal FRAC) ir azoksistrobinas iš strobilurinių grupės (ląstelių kvėpavimo inhibitorius – bc1 citochromo inhibitorius – Qol fungicidai, 11 grupė pagal FRAC).

Pagal ligų sukėlėjų atsparumo populiacijos mažinimo strategiją, be kita ko, rekomenduojama:

- produktą naudoti daugiausia profilaktiškai,
- nenaudoti produkto kitomis normomis nei rekomenduojamos,
- naudokite integruotoje purškimo programoje su kito veikimo būdo fungicidais.
- taikykite integruotą ligų kontrolės sistemą: pasirinkite atsparesnes ligai veisles, nepalikite augalų liekanų dirvos paviršiuje, kontroliuokite piktžoles, kurios gali tapti ligų sukėlėjų prieglobsčiu.

TIRPALO PARUOŠIMAS

Purškiamą tirpalą būtina paruošti prieš pat jį naudojant. Prieš naudojant suplakti pakuotės turinį.

Prieš pradedant ruošti tirpalą nustatyti reikiamą jo tūrį ir produkto kiekį. Pildant purkštuvą laikytis purkštuvo gamintojo instrukcijos nurodymų. Jeigu instrukcijos nėra, pamatuotą produkto kiekį pilti į purkštuvo talpą, iš dalies pripildytą vandens (kai maišytuvą įjungtas).

Tirpalas ruošiamas prieš pradedant apdorojimo augalų apsaugos produktais darbus. Prieš pradedant ruošti tirpalą, įsitikinkite, kad purkštuvą yra kruopščiai išplautas, ypač jei jis buvo naudotas kitiems augalams purkšti. Tiksliai nustatykite reikiamą tirpalo tūrį ir produkto kiekį. Prieš atidarant pakuotę, produktą gerai suplakite.

Pildant purkštuvą laikytis purkštuvo gamintojo pateiktų instrukcijų. Jei instrukcijos nėra, pusę purkštuvo talpos užpildykite švariu vandeniu, įjunkite maišytuvą, supilkite reikiamą kiekį

GAVIAL 375 SC ir baikite pilti vandenį. Purškimo ir trumpų pertraukėlių metu maišytuvas turi būti įjungtas.

Jeigu purškimo procese daromos pertraukos, prieš pradėdant purkšti iš naujo, būtina gerai išmaišyti tirpalą, esantį purkštuvo talpykloje.

SAUGOS PRIEMONĖS

Dirbant su neskiestu produktu ar liečiant juo užterštus paviršius būtina dėvėti darbo drabužius – kombinezoną arba ilgas kelnes su švarku ilgomis rankovėmis, kurie turi būti pagaminti iš medvilninio audinio (tankumas >300 g/m²) arba medvilninio ir poliesterio audinio (tankumas >200 g/m²) bei avėti tvirtą avalynę. Būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą EN 374): pvz., polivinilchloridines, latekso, nitrilo (≥0,4 mm) ar kt.

Purškiant traktoriniais lauko purkštuvais būtina dėvėti darbo drabužius – kombinezoną arba ilgas kelnes su švarku ilgomis rankovėmis, kurie turi būti pagaminti iš medvilninio audinio (tankumas >300 g/m²) arba medvilninio ir poliesterio audinio (tankumas >200 g/m²) bei avėti tvirtą avalynę. Dirbant purkštuvo priežiūros darbus, liečiant produkto tirpalu užterštus paviršius būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374).

DĖMESIO! Siekiant apsaugoti pašalinius asmenis ir gyventojus operatoriai privalo naudoti ne mažiau kaip 50 proc. dulksną mažinančius purkštukus arba laikytis ne mažesnės kaip 5 metrų apsaugos zonos iki kelių kelkraščių ribos, gyvenamųjų, visuomeninės paskirties, rekreacinių ir bendro naudojimo teritorijų ribos.

Darbuotojams, darbo tikslais einantiems į apdorotus plotus, galima įeiti tik jiems visiškai išdžiūvus. Darbuotojams būtina dėvėti ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis, avėti sandarius batus bei rekomenduojama mūvėti pirštines.

Higienos ir kitos priemonės. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Stengtis neįkvėpti rūko, garų ir dulksnos. Po darbo ar prieš pertraukas nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Darbo drabužius laikyti atskirai. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti. Jei neįmanoma išvalyti asmeninių apsaugos priemonių, būtina sunaikinti laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų.

PIRMOJI PAGALBA

Įkvėpus: išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.

Patekus ant odos: nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

Prarijus: Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) vandens. Nedelsiant kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę arba etiketę.

Patarimai gydytojui: konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominių gydymą

Informacija apsinuodijimo atveju +370 52 362 052.

PURKŠTUVO VIDAUS PLOVIMAS

Iš karto po purškimo kruopščiai išplaukite purškimo įrangą. Visiškai ištuštinkite purkštuvo talpą apdorotame lauke. Nuimkite visus filtrus ir purkštukus. Jie turi būti išplauti atskirai. Mažiausiai 3

kartus kruopščiai išplaukite purkštuvą talpą švari vandeniu. Galima įdėti tam skirtos plovimo priemonės. Kiekvieną kartą plaunant purkštuvą, vandens įpilkite ne mažiau 10 % purkštuvą talpos tūrio. Talpą išplaukite vidiniais purkštukais. Vandenį išleiskite pro vamzdynus. Plovimui naudotą tirpalą išpurškite ant to paties lauko, kur buvo naudotas produktas.

TUŠČIŲ PAKUOČIŲ TVARKYMAS

Supylus augalų apsaugos produktą į augalų apsaugos produktų purškimo įrangą, augalų apsaugos produktų pakuotės turi būti skalaujamos taikant integruotojo skalavimo (skalaujant suspausto vandens srove) ar trigubo skalavimo metodus. Vanduo, panaudotas augalų apsaugos produktų pakuotei išskalauti, supilamas į purkštuvą talpą su ruošiamu tirpalu. Išskalautos augalų apsaugos produktų pakuotės tvarkomos vadovaujantis atliekų tvarkymą nustatančiais teisės aktais.

Nenaudoti tuščios pakuotės kitiems tikslams.

PRODUKTO SAUGOJIMAS

Laikyti tik originalioje pakuotėje, temperatūra laikymo metu turi būti 0°C - +30°C. Taip pat laikyti kitų augalų apsaugos produkto saugojimo reikalavimų nurodytą Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklėse.

GAMINTOJO ATSAKOMYBĖ

Gamintojas garantuoja už produkto kokybę, jei jis gautas originaliame gamykliniame įpakavime, tinkamai laikomas ir naudojamas. Gamintojas neatsako už nuostolius, atsiradusius dėl veiksnių (pvz. ekstremalių aplinkos sąlygų), kurių jis negali kontroliuoti. Visos produkto naudojimo rekomendacijos yra pateikiamos remiantis dabartine gamintojo patirtimi.